

DE

Wirkung von Gynofit Milchsäure-Gel

Gynofit Milchsäure-Gel dient dazu, den physiologischen pH-Wert des Vaginalmilieus zu stabilisieren und dadurch die Vaginalflora zu normalisieren.


Vorgesehene Anwendung

Gynofit wurde in Zusammenarbeit mit Gynäkologen für eine schnelle und sanfte Linderung von Vaginalproblemen entwickelt.

- Zur Vorbeugung und kurzzeitigen Behandlung (in der Regel 6–12 Tage) von bakterieller Vaginose und Scheidenpilzinfektionen.
- Zur Anwendung bei bakterieller Vaginose in Kombination mit Antibiotika.
- Normalisiert die Vaginalflora und reguliert den pH-Wert.
- Vermindert unangenehmen Geruch und Ausfluss.
- Lindert unmittelbar Reizungen, Rötungen, Brennen und Juckreiz.

Art der Anwendung und Dosierung

Gynofit ist ein Gel, welches man am Abend in liegender Stellung in die Scheide einführt. Jede Tube entspricht einer Anwendungsmenge. Das Gel wird direkt aus dem speziell geformten, versiegelten Applikator in die Vagina eingebracht.



1. Schütteln des Tubeninhaltes gegen die Tubenspitze

2. Abbrechen der Spitze der Tube durch Abdrehen

3. Einführen des Applikators in die Scheide

4. Vollständiges Ausdrücken des Inhalts in die Scheide

Nebenwirkungen

Die Zusammensetzung von Gynofit Milchsäure-Gel lässt bei sachgemässer Anwendung gemäss Herstellerempfehlung das Auftreten von Nebenwirkungen über ein anfängliches, aber reversibles Brennen und/oder Jucken hinaus nicht erwarten. Bei hierfür prädisponierten Menschen, insbesondere auch bei vorgeschädigter Vaginalschleimhaut etwa durch ungünstige Pflege-, Hygiene- oder lokalkontrazeptive Massnahmen, können im Einzelfall auch Schleimhautreizungen durch das Gel auftreten. In diesem Falle ist die Anwendung von Gynofit Milchsäure-Gel abzubrechen; auch auf spätere erneute Anwendung sollte verzichtet werden.

Gegenanzeigen

Bei bekannter Allergie gegen die unten genannten Inhaltsstoffe ist von der Anwendung von Gynofit Milchsäure-Gel abzusehen. Bei Auslösung entsprechender Reaktionen ist die Anwendung des Gels unverzüglich abzubrechen. Gegebenenfalls ist ein Arzt aufzusuchen.

Anwendung

Kurzzeitige Anwendung bei bakterieller Vaginose und Scheidenpilzinfektionen. Bei schlecht riechendem Ausfluss, Reizungen, Rötungen, Brennen und Juckreiz im Vaginalbereich.
Behandeln: 6–12 Tage lang jeweils 1 Applikator idealerweise abends anwenden, bis die Beschwerden nicht mehr vorhanden sind. Vorbeugen: Nach der Menstruation, Geschlechtsverkehr und Schwimmbadbesuch 1–2 Tage lang jeweils 1 Applikator anwenden. Gynofit Milchsäure Vaginal-Gel bevorzugt vor dem Schlafengehen anwenden.

Hinweise

Wenn die Beschwerden auch bei vorschriftsmässiger Anwendung nicht gelindert werden, so setzen Sie sich bitte spätestens nach 12 Tagen ununterbrochener Anwendung mit Ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung. Gynofit kann nicht zur Empfängnisverhütung verwendet werden und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe.


Bezüglich der Anwendung bei Schwangeren und Stillenden liegen keine Informationen vor. Gynofit Milchsäure-Gel kann zusammen mit Kondomen angewendet werden.


Ausser Reichweite von Kindern aufbewahren. Tuben vollständig entleeren, geöffnete Tuben kein weiteres Mal verwenden. Beschädigte Applikatoren dürfen nicht verwendet werden. Bei Raumtemperatur (15–25 °C) aufbewahren. Verfalldatum siehe Packungsaufdruck.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

 Swiss Development

 Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen


 Tentan Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Vertrieb CH: Tentan AG, 4452 Itingen

Vertrieb DE & AT: H&M Holzinger Cosmetic Vertriebs-Gesellschaft m.b.H, 5017 Salzburg-AT

www.gynofit.com

08.2023



GR

Τρόπος δράσης της γέλης Gynofit με γαλακτικό οξύ

Η γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση του φυσιολογικού pH του κόλπου, αποκαθίστώντας έτσι την κολληκή χλωρίδα.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Gynofit αναπτύχθηκε σε συνεργασία με γυναικόλογους για την ταχεία και ήπια ανακούφιση των προβλημάτων στην κολληκή περιοχή.

- Για την πρόληψη και τη βραχυχρόνια θεραπεία (συνήθως 6-12 ημέρες) της βακτηριακής κολπίτιδας και των κολληκών μυκητιάσεων.
- Για τη θεραπεία της βακτηριακής κολπίτιδας σε συνδυασμό με αντιβιοτικά.
- Αποκαθιστά την κολληκή χλωρίδα και ρυθμίζει το pH του κόλπου.
- Μειώνει τις δυσάρεστες οσμές και εκκρίσεις.
- Ανακουφίζει αμέσως από ερεθισμό, ερυθρότητα, αίσθημα καύσου και κνησμό.

Τρόπος χρήσης και δοσολογία

Το Gynofit συνιστάται σε γέλη η οποία εφαρμόζεται στον κόλπο σε ύπτια θέση το βράδυ. Κάθε ωαληνάριο περιέχει μία δόση. Η γέλη εφαρμόζεται απευθείας στο εσωτερικό του κόλπου πιέζοντας το ειδικά διαμορφωμένο και σφραγισμένο ωαληνάριο εφαρμογής.



1. Ανακινήστε το ωαληνάριο για τη μεταφορά του περιεχομένου στο άκρο του

2. Κόψτε το άκρο του ωαληναρίου στριβοντάς το

3. Εισαγάγετε το άκρο εφαρμογής στον κόλπο

4. Πιέστε το ωαληνάριο για να εισέλθει το περιχόμενο στον κόλπο

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Βάσει της σύστασης, και υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ορθά, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, η γέλη Gynofit με γαλακτικό γξύ δεν αναμένεται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, πέραν ενός αρχικού, αλλά παροδικού αισθήματος καύσου ή/και κνησμού. Σε άτομα με προβλεπόμενη εμφάνιση ζηρότητας, ιδίως εάν ο κόλπος βρίσκεται υπό επεξεργασία, η γέλη εφαρμόζεται απευθείας στο εσωτερικό του κόλπου πιέζοντας το ειδικά διαμορφωμένο και σφραγισμένο ωαληνάριο εφαρμογής.

Αντενδείξεις

Μη χρησιμοποιείτε τη γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ εάν γνωρίζετε ότι είστε αλλεργικοί σε οποιοδήποτε από τα συστατικά που παρατίθενται παρακάτω. Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων αντιδράσεων, διακομίστε τη χρήση της γέλης και μη συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε γιατρό.

FR

Mode de fonctionnement du gel à l'acide lactique Gynofit

Le gel à l'acide lactique Gynofit est utilisé pour stabiliser le pH physiologique du vagin et rétablir ainsi l'équilibre naturel de la flore vaginale.


Indication

Gynofit a été élaboré en collaboration avec des gynécologues dans le but de soulager les désagréments vaginaux rapidement et tout en douceur.

- En prévention et dans le traitement de courte durée (généralement de 6 à 12 jours) de la vaginose bactérienne et de la mycose vaginale.
- Utiliser en association avec des antibiotiques en cas de vaginose bactérienne.
- Rééquilibre la flore vaginale et régule le pH.
- Réduit les odeurs désagréables et les pertes vaginales.
- Apaise instantanément les irritations, rougeurs, sensations de brûlure et démangeaisons.

Mode d'emploi et posologie

Gynofit est un gel qui doit être introduit dans le vagin en position couchée, dans la soirée. Chaque tube contient la dose nécessaire pour une application. Le gel est déposé directement dans le vagin au moyen de l'applicateur ergonomique scellé.



1. Agiter le contenu du tube en direction de la pointe du tube

2. Casser et détacher la pointe du tube en la faisant tourner

3. Introduire l'applicateur dans le vagin

4. Presser le tube pour en vider le contenu dans le vagin

Effets indésirables

Étant donné la composition du gel à l'acide lactique Gynofit, si le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant, la survenue d'effets indésirables est improbable, hormis les brûlures et/ou démangeaisons initiales réversibles. Chez les personnes prédisposées, en particulier si la muqueuse vaginale est déjà endommagée en raison de mesures de soin, d'hygiène ou de contraception locale inadaptées, par exemple, le gel peut également provoquer une irritation de la muqueuse dans des cas isolés. Le cas échéant, il conviendra d'arrêter l'utilisation du gel à l'acide lactique Gynofit et de ne plus le réutiliser par la suite.

Contre-indications

N'utilisez pas le gel à l'acide lactique Gynofit si vous êtes allergique à l'un des composants mentionnés ci-dessous. En cas de réaction allergique, arrêtez immédiatement d'utiliser le gel. Consultez un médecin, si nécessaire.

Utilisation

Utilisation de courte durée en cas de vaginose bactérienne et de mycose vaginale. En cas de pertes malodorantes, irritations, rougeurs, sensations de brûlure et démangeaisons de la zone vaginale. Traitement: utiliser un applicateur à chaque fois pendant 6 à 12 jours idéalement le soir, jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. En prévention: utiliser 1 applicateur après les menstruations, les rapports sexuels et la piscine pendant 1 ou 2 jour(s).

Appliquer le gel vaginal à l'acide lactique Gynofit de préférence au coucher.

Remarques

Si les symptômes persistent malgré une utilisation correcte du gel, consultez votre médecin ou pharmacien après 12 jours d'utilisation continue au maximum. Gynofit ne contient pas de spermicide et ne peut donc pas être utilisé comme contraceptif.


Aucune information n'est disponible concernant l'utilisation du gel pendant la grossesse et l'allaitement. Le gel à l'acide lactique Gynofit est compatible avec les préservatifs. Tenir hors de la portée des enfants. Les tubes doivent être entièrement vidés et ne peuvent pas être réutilisés, une fois entamés. Ne pas utiliser les applicateurs endommagés.


À conserver à température ambiante (entre 15–25 °C). Pour la date de péremption, voir l'emballage.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

 Swiss Development

 Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen

 Tentan Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Distributeur Suisse : Tentan AG, 4452 Itingen

Distributeur France : Almafai, 68100 Mulhouse

www.gynofit.com

08.2023



IT

Meccanismo d'azione del gel all'acido lattico Gynofit

Il gel vaginale all'acido lattico Gynofit si usa per stabilizzare il pH fisiologico dell'ambiente vaginale e normalizzare così la flora vaginale.

Uso previsto

Gynofit è stato sviluppato in collaborazione con esperti ginecologi per alleviare i problemi vaginali in modo rapido e delicato.

- Per la prevenzione e il trattamento di breve durata (di norma 6-12 giorni) di vaginosi batteriche e micosi vaginali.
- Da utilizzare in caso di vaginosi batterica in combinazione con antibiotici.
- Normalizza la flora vaginale e regola il valore di pH.
- Riduce gli odori sgradevoli e le secrezioni.
- Offre immediato sollievo in caso di irritazioni, arrossamenti, bruciore e prurito.

Modo di somministrazione e posologia

Gynofit è un gel da applicare all'interno della vagina, la sera, stando in posizione sdraiata. Ogni tubetto monodose contiene la quantità di gel necessaria per un'applicazione. Il gel viene introdotto direttamente nella vagina utilizzando l'apposito applicatore anatomico sigillato.



1. Agitare il tubetto in modo da far fluire il gel verso la punta

2. Ruotare e rimuovere la punta dell'applicatore

3. Inserire l'applicatore nella vagina

4. Spremere bene il tubetto, per somministrare tutto il gel in esso contenuto

Effetti collaterali

La composizione del gel vaginale all'acido lattico Gynofit, se il prodotto viene utilizzato correttamente seguendo le istruzioni del produttore, non causa altri effetti collaterali se non una iniziale e transitoria sensazione di bruciore e/o prurito. Tuttavia, in casi isolati, in soggetti predisposti e in particolare in presenza di preesistenti lesioni della mucosa vaginale dovute a trattamenti inadeguati, igiene inappropriata o a misure contraccettive locali, il gel può anche causare irritazione alla mucosa vaginale. In questo caso sospendere immediatamente l'uso del gel vaginale all'acido lattico Gynofit ed evitare di impiegarlo nuovamente in futuro.

Controindicazioni

Non usare il gel vaginale all'acido lattico Gynofit in caso di allergia nota nei confronti di uno o più componenti tra quelli di seguito elencati. Se si verificano reazioni allergiche, sospendere immediatamente l'uso del gel. Se necessario consultare un medico.

Applicazione

Impiego di breve durata nella cura di vaginosi batterica e micosi vaginali. In caso di secrezioni maleodoranti, irritazioni, arrossamenti, bruciore e prurito nella zona vaginale. Trattamento: utilizzare 1 applicatore, per una durata da 6 a 12 giorni, preferibilmente la sera, fino alla scomparsa dei sintomi.

Prevenzione: utilizzare 1 applicatore per 1-2 giorni dopo le mestruazioni, i rapporti sessuali e dopo essere state in piscina. Usare Gynofit gel all'acido lattico preferibilmente prima di andare a letto.

Avvertenze

Se i sintomi persistono nonostante l'uso corretto, rivolgersi al proprio medico o al farmacista dopo 12 giorni di uso continuato al massimo. Gynofit non contiene sostanze spermicide e quindi non può essere usato per la contraccezione. Non ci sono informazioni sull'uso del gel vaginale all'acido lattico Gynofit in gravidanza e durante l'allattamento. Il gel vaginale all'acido lattico Gynofit può essere usato assieme ai preservativi.


Tenere fuori dalla portata dei bambini. Svuotare completamente i tubetti, non riutilizzare i tubetti aperti. Gli applicatori danneggiati non vanno utilizzati.


Conservare a temperatura ambiente (15–25 °C).


Per la data di scadenza del prodotto, vedere la confezione.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

 Swiss Development

 Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen

 Tentan Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Distribuzione CH: Tentan AG, 4452 Itingen

www.gynofit.com

08.2023



TR

Gynofit Laktik Asit Jel Etkisini Nasıl Gösterir

Gynofit Laktik Asit Jel, vajinal ortamın fizyolojik pH değerini stabilize etmek ve bölüellekle vajinal florayı normalleştirme amacıyla kullanılır.

Kullanım amacı

Gynofit, vajinal bölgede gözlemlenen sorunları hızlı ve etkili bir şekilde gidermeye yardımcı olmak üzere jinekologlar ile işbirliği içinde geliştirilmiştir.

- Bakteriyel vajinozis ve vajinal mantar enfeksiyonlarını önlemek ve kısa süreli tedavi etmeye (genellikle 6-12 gün) yardımcı olmak için kullanılır.
- Antibiyotikler ile birlikte bakteriyel vajinozisi tedaviye yardımcı olmak için kullanılır.
- Vajinal florayı normalleştirmeye ve pH değerini düzenlemeye yardımcı olur.
- İstenmeyen kokuları ve akıntıyı azaltır.
- Tahriş, kızamıkçık, iyunme ve kaşıntı gibi etkiləri kısa sürede gidermeye yardımcı olur.

Kullanım yöntemi ve dozu

Gynofit, akşamları uzanır pozisyonda yatarken vajına içine yerleştirilen bir jeldir. Her tüp, bir uygulama dozu içermektedir. Jel, özel olarak şekillendirilmiş ve mühürlenmiş olan aplikatörden doğrudan vajına içine sikilir.

Yan etkiler

İçeriğine bakılacak olursa ve üreticimin tavsiyesine göre doğru bir şekilde kullanıldığında takdirde, Gynofit Laktik Asit Jel'in ilk başta hissedilen ancak sonra geçen herhangi bir yan etkisinin olması muhtemel değildir. Özellikle, örneğin uygunsuz bakım, hijyen veya lokal dozumun kontrol yöntemleri sebebiyle oldugu mümkünlü halinde jel, izole vakarlarda mukozal tahrişe de neden olabilir. Böyle bir durumda Gynofit Laktik Asit Jel'i kullanmaya bırakın ve ayrıca daha sonraki bir tarihte kullanmaya devam etmekten de kaçının.

Contrendikasyonlar

Aşağıda listelenen içeriğindeki maddelerden herhangi birine alerjini oldugu biliniyorsa, Gynofit Laktik Asit Jel'i kullanmayın. Bu

EN

How Gynofit Lactic Acid Gel works

Gynofit Lactic Acid Gel is used to stabilise the physiological pH of the vaginal environment and thus normalise the vaginal flora.


Intended use

Gynofit has been developed in cooperation with gynaecologists for fast and gentle relief of vaginal problems.

- For prevention and short-term treatment (generally 6-12 days) of bacterial vaginosis and vaginal yeast infections.
- For treatment of bacterial vaginosis in combination with antibiotics.
- Restores the vaginal flora and regulates the pH value.
- Reduces unpleasant odours and discharge.
- Immediately relieves irritation, redness, burning and itching.

Method of use and dose

Gynofit is a gel that is introduced to the vagina in a lying position in the evening. Each tube contains one application dose. The gel is directly introduced to the vagina from the specially shaped, sealed applicator.



1. Shake the tube contents towards the tip of the tube

2. Break off the tip of the tube by twisting it off

3. Introduce the applicator to the vagina

4. Squeeze out the contents into the vagina

Side effects

Judging from its composition and provided it is used properly according to the manufacturer's recommendation, Gynofit Lactic Acid Gel is not likely to have any side effects apart from initial but reversible burning and/or itching. In predisposed individuals, especially if the vaginal mucosa is already damaged owing to unsuitable care, hygiene or local contraceptives for example, the gel can also cause mucosal irritation in isolated cases. In such a case, discontinue using Gynofit Lactic Acid Gel; also refrain from resuming use at a later date.

Contraindications

Do not use Gynofit Lactic Acid Gel if you are known to be allergic to any of the ingredients listed below. If such reactions are triggered, immediately discontinue using the gel. Consult a doctor if necessary.

Use

Short-term use for bacterial vaginosis and vaginal yeast infections. In the case of bad smelling discharge, irritation, redness, burning and itching in the vaginal area.

Treatment: Use for 6 – 12 days, ideally in the evening, with 1 applicator for each application, until there is no longer any discomfort.

Prevention: After menstruation, sexual intercourse and visiting a swimming pool, use for 1 – 2 days, with 1 applicator for each application.

Gynofit Lactic Acid Vaginal Gel is best applied before going to bed.

Notes

If the symptoms are not alleviated despite proper use, please consult your doctor or pharmacist after 12 days of continued use at the latest. Gynofit cannot be used for contraception and it does not contain any spermicidal ingredients.

As regards use during pregnancy and breastfeeding there is no information available. Gynofit Lactic Acid Gel can be used together with condoms.


Store out of children's reach. Empty the tubes completely and do not use opened tubes a second time. Do not use damaged applicators.

Store at room temperature (15–25 °C). For the use-by date see packaging.

Ingredients:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methylcellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

 Swiss Development

 Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen

 Tentan Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Swiss distributor: Tentan AG, 4452 Itingen

UK distributor: Tentan UK Ltd., Four Winds Stansted CM24 8UF, UK

www.gynofit.com

08.2023



HR

Kako djeluje Gynofit gel s laktatnom (mliječnom) kiselinom

Gynofit gel s laktatnom (mliječnom) kiselinom primjenjuje se za stabilizaciju fiziološkog pH okruženja rodnice i na taj način normalizaciju flore rodnice.

Namjena

Gynofit je razvijen u suradnji s ginekolozima za brzo i nježno ublažavanje tegoba rodnice.

- Za sprječavanje i kratkotrajno liječenje (obično 6 – 12 dana) bakterijske vaginoze i infekcije rodnice glijivicama iz roda kvasnica.
- Za liječenje bakterijske vaginoze u kombinaciji s antibioticima.
- Obnavlja floru rodnice i iscrplju pH vrijednost.
- Smanjuje neugodan miris i iscjedak.
- Odmah ublažava nadraženost, crvenilo, osjećaj pečenja i svrbež.

Način primjene i doziranje

Gynofit je gel koji se stavlja u rodnicu u ležećem položaju, navečer. Jedna tuba je za jednokratnu primjenu. Gel se istiskuje izravno u rodnicu iz posebno oblikovanog, zabrtvljenog aplikatora.

Χρήση

Βραχυπρόθεση χρήση για αντιμετώπιση βακτηριακής κολπίτιδας και κολπικών μυκητιάσεων. Για περιπτώσεις δύσοσμων εκκρίσεων, ερεθισμού, ερυθρότητας, αισθη- ματος καύσου και κνησμού στην κολπική περιοχή. Θεραπεία: Χρησιμοποιήστε ένα σωληνάριο για διά- στημα 6-12 ημερών, ιδανικά το βράδυ, μέχρι να υπο- χαρθούν πλήρως οι ενοχλήσεις.

Πρόληψη: Έπειτα από εμμηνορροία, σεξουαλική επα- φή και επίσκεψη σε πισίνα, χρησιμοποιήστε 1 σωληνά- ριο για 1-2 ημέρες. Η κολπική γέλη Gynofit με γαλακτικό οξύ εφαρμόζε- ται κατά προτίμηση πριν από την κατάκλιση.

Σημειώσεις

Αν χρησιμοποιείτε τη γέλη σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοπόι σας έπειτα από 12 ημέρες συνεχούς χρήσης το αργότερο. Το Gynofit δεν μπο- ρεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αντισύλληψης και δεν περιέχει σπERMατοκτόνα συστατικά.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες όσον αφορά τη χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Η γέλη Gynofit με γαλακτικό γξύ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με προφυλακτικά.


Φυλάσσετε μακριά από παιδιά.


Αδειάζετε το περιεχόμενο των σωληναρίων. Μην επανα- χρησιμοποιείτε ανοιγμένα σωληνάρια. Απαγορεύεται η χρήση σωληναρίων που έχουν υποστεί ζημιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15–25 °C). Για την ημερομηνία λήξης, βλ. τη συσκευασία.

Συστατικά:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl- cellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodium Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

 Swiss Development

 Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen

 Tentan Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Διανομέας Ελβετίας: Tentan AG, 4452 Itingen

Διανομέας Ελλάδας: KITE Hellas Ltd., Λεωφόρος Ιωνίας 166, 111 44 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 2014306

www.gynofit.com
08.2023















































































































































































































Vartojimas


Skirtas trumpalaikiam **šaltuosioms genitalinėms infekcijoms**, ypač ir makšties kandidozės gydymui. Vartojamas pasireiškus nematant kvapą turinčioms išskyroms, dirginimui, paraudimui, deginimui ir niežėjimui makšties srityje. Naudojimas: 6–12 dienų naudoti po 1 aplikatorių, geriausia vakarais, kol simptomai praeis. Profilaktika: po menstruacijų, lytinio akto ir apsilankymo baseine 1–2 dienas naudoti 1 aplikatorių.


„Gynofit“ pieno rūgšties makšties gelį geriausia vartoti prieš miegą.
Pastabos
Jei tinkamai vartojant simptomai nesumažėja, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką ne vėliau kaip po 12 dienų nuolatinio vartojimo. „Gynofit“ negalima vartoti kontracepcijai, jo sudėtyje nėra spermicidinių pagalbinių medžiagų. Informacijos apie vartojimą nėštumo ir žindy- mo metu nėra. „Gynofit“ pieno rūgšties gelį galima vartoti kartu su prezervatyvais. Laikyti laikams nepasiekiamoje vietoje. Visišškai ištušinkite tūbeles ir nenaudokite atidarytų tūbelių antrą kartą. Pažeistų aplikatorių naudoti negalima. Laikyti kambario temperatūroje (15–25 °C). Tinkamumo laikas nurodytas ant pakuotės.

Sudėtis:

Aqua, Propylene Glycol, Hydroxypropyl Methyl- cellulose, Lactic Acid, Sodium Lactate, Caprylyl Glycol, Levulinic Acid, Glycogen, Glycerin, Sodi- um Levulinate, Sodium Hydroxide, P-Anisic Acid

 Swiss Development

 Tentan AG, Dellenbodenweg 8, CH-4452 Itingen

 Tentan Deutschland GmbH, Schloss Beuggen 3, 79618 Rheinfelden, Deutschland

Platintojas Šveicarijoje: Tentan AG, Itingen CH-4452

Platintojas Lietuvoje: UAB „ViaMedPharma“, Vilnius LT-04352

www.gynofit.com
08.2023

